



ANTECEDENTE: No hay

MATERIA: Informa campaña de puesta al día contra sarampión año 2026

SANTIAGO, 30 de Junio de 2026

DE : SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Junto con saludar, el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, informa la realización de la “Campaña de puesta al día contra el sarampión 2026”, en el contexto de la alerta epidemiológica por aumento de casos de sarampión en los años 2025-2026. Esta estrategia se implementará según las siguientes directrices técnicas:

Objetivo General

Prevenir la morbilidad grave y la mortalidad atribuibles a la infección por virus del sarampión a través de la vacunación de la población definida para esta campaña.

Objetivos Específicos

1. Vacunar con 1ª dosis de vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), a lactantes desde los 13 meses y preescolares hasta los 35 meses que no cuentan con registro de haber recibido esta dosis.
2. Vacunar a los preescolares y escolares entre 36 meses y 1er año básico, según los antecedentes de vacunación:
 - Iniciar esquema en los preescolares y escolares que no cuenten con registro de 2 dosis, con un intervalo mínimo de 4 semanas.
 - Completar esquema con la 2ª dosis, en aquellos que cuentan con registro de solo 1 dosis anterior.

Población objetivo

Lactantes, preescolares y escolares de 13 meses a 1er año básico, que no estén al día con su esquema de vacunación programática de vacuna SRP.

Consideraciones para la vacunación

- Esta campaña de vacunación de puesta al día se ejecutará de forma selectiva, con el respaldo de los antecedentes de vacunación (RNI o carné), para toda la población objetivo que vive en Chile, para iniciar o completar esquema de vacuna SRP según calendario vigente.
- Todo lactante a partir de los 13 meses que no cuente con registro válido de la primera dosis, debe vacunarse en forma inmediata con SRP y completar su esquema a los 36 meses.
- Los preescolares y escolares desde los 37 meses hasta 1º básico, que no cuenten con registro válido de vacunación SRP, deberán iniciar esquema de 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas.
- Los preescolares y escolares desde los 37 meses hasta 1º básico que cuenten con antecedente válido de 1 dosis de SRP, deben completar esquema con intervalo mínimo de 4 semanas.
- Reforzar a vacunación programática a los 12 y 36 meses de acuerdo a calendario vigente

Ejecución:

La estrategia se desarrollará en los vacunatorios públicos y privados en convenio con las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.

Además, se realizará vacunación extramural en establecimientos educacionales (colegios, jardines infantiles y salas cunas).

Meta:

Coberturas del 95% de la población objetivo, en primera y segunda dosis a nivel nacional, regional y por comuna.

Fecha inicio de la campaña: 06 de julio 2026

Vacuna a utilizar

Las características de la vacuna a utilizar se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características de la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis, laboratorio Serum Institute of India.

Nombre	Vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP)
Laboratorio	Serum Institute of India
Presentación	Vial monodosis con liofilizado más ampolla con diluyente de 0,5 ml para su reconstitución
Dosis	0,5 mL.
Vía de administración	Subcutánea
Contraindicaciones y advertencias	En reacciones de hipersensibilidad graves (anafilaxia) a los componentes de la vacuna. La vacuna puede contener trazas de neomicina. No administrar después de gammaglobulinas o transfusiones de sangre. Puede ser que en individuos que estén recibiendo corticoesteroides, otras drogas inmunosupresoras o que están recibiendo la radioterapia como tratamiento, no desarrollen una respuesta inmune óptima. La vacuna no debe ser administrada en condiciones febriles, enfermedades infecciosas agudas, leucemia, anemia y otras enfermedades severas del sistema Las enfermedades menores, como fiebre leve, infecciones respiratorias leves o diarrea leve, no constituyen contraindicación para la vacunación. El componente parotiditis de la vacuna SRP se cultiva en fibroblastos de embrión de pollo libres de patógenos específicos. La alergia al huevo, incluso con antecedente de anafilaxia (certificada), no es una contraindicación para su administración. En estos casos, la vacuna debe administrarse en un establecimiento con capacidad para manejar una anafilaxia y observar al vacunado por al menos 1 hora. La misma precaución aplica para personas con alergia a la proteína de leche de vaca
Reacciones adversas	Reacciones locales: • Muy frecuentes: dolor, sensibilidad en el sitio de inyección. Reacciones sistémicas: • Muy frecuentes: fiebre, artralgia y artritis (mayoritariamente en mujeres adolescentes y adultas). • Frecuentes: erupción (aparece entre los 7-10 días posterior a la administración). • Raras: trombocitopenia, anafilaxia, urticaria, prurito. • Muy raras: meningitis aséptica, encefalitis (No se ha comprobado relación causal). Uno de los eventos adversos descritos para la vacuna SRP es la parotiditis post vacunal, que se presenta en un 1% de los vacunados aproximadamente. En general su presentación es atenuada y se caracteriza por una inflamación unilateral o bilateral de la glándula parótida que se presenta 10 a 28 días posterior a la vacunación y muy rara vez produce complicaciones como orquitis, púrpura u otros.
Se adjunta folleto del fabricante	

El Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI)

El registro de la Campaña de puesta al día contra el sarampión 2026, se realizará en el módulo de "Inmunizaciones PNI", según el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar tipo de documento: RUN, Pasaporte u otro, en ese orden de prioridad.
2. Verificar y actualizar datos personales: confirmar con el/la usuario/a sus datos personales.
3. Identificar al vacunador.
4. Registrar y/o actualizar la comuna residencia.
5. Ingresar a la pestaña de enfermedad: Sarampión.
6. Registrar información de la vacunación:
 - Seleccionar la vacuna: SRP monodosis.
 - Dosis: 1ª dosis programática o 2ª dosis programática.
 - Criterio de elegibilidad: vacunación programática.
 - Seleccionar el "Lote" de acuerdo con el número de serie o lote del envase secundario.
7. Guardar el registro
 - Una vez completados todos los campos, hacer clic en "Guardar".
 - El sistema mostrará el mensaje: "Datos guardados exitosamente".

Consulta de Historial de Vacunación:

Los padres, tutores o cuidadores, pueden obtener la información de las vacunas administradas a sus hijos, desde el año 2021 en adelante, ingresando a la plataforma digital Portal Paciente en el siguiente enlace: <https://portalpaciente.minsal.cl/>

Se solicita dar amplia difusión a lo instruido en el presente documento.

Agradeciendo su compromiso con la salud de la población, saluda atentamente,

ALEJANDRA VALENTINA PIZARRO IBAÑEZ

30-06-2026

SUBSECRETARIA(O) DE SALUD PUBLICA

Ministerio de Salud



Nombre	Cargo	Fecha Visación
Marcela Rivas Iglesias	PROFESIONAL -	26/06/2026 13:30:52
Marcela Avendaño Viguera	COORDINADOR(A) UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA	26/06/2026 13:34:22
Ignacio Castro Aguirre	JEFE(A) DEPARTAMENTO DE INMUNIZACIONES - DIPRECE	26/06/2026 13:39:02
Marcela Silva Montes	JEFE(A) DIVISION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	26/06/2026 17:26:18
Maria Ester Aylwin Rios	JEFE(A) (S) DE GABINETE SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	30/06/2026 15:44:39

Distribución:

- Secretarías/os Regional Ministerial de Salud del país.
- Directoras/es Servicio de Salud del país.
- Referente Programa Nacional de Inmunizaciones SEREMI de Salud del país.
- Directores/as Técnicos de los Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas
- Referente Programa Nacional de Inmunizaciones Servicio de Salud del país.
- Gabinete Ministra
- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Departamento de Epidemiología
- División de Prevención y Control de Enfermedades
- Asistencia Remota en Salud
- Departamento de Inmunizaciones
- Oficina de Partes y Archivo

Código: cXIEU1IFVw validar en <https://ceropapel.minsal.cl/validadoc-minsal>